

Лечение сосудистых звёздочек микросклерозированием и лазером

Сосудистые звёздочки - это маленькие расширенные артерии непосредственно под кожей, в большинстве случаев на ногах. Несмотря на то, что лечение лазером неоднократно позиционируется как подходящая методика, вплоть до сегодняшнего дня облитерация с использованием этоксисклеролсодержащего раствора в концентрациях различной степени является самым простым и действенным методом. Очень тонкие сосуды дополнительно можно иногда лечить лазером. Это мы тоже предлагаем в клинике им. Эриха Лексера.

Кому показана облитерация?

Облитерация показана мужчинам и женщинам с беспокоящими тонкими расширениями сосудов нижних конечностей. Важным является исключение хронического варикозного расширения вен, которое должно лечиться терапевтическим путём перед процедурой склерозирования. Для исключения заболеваний венозной системы, требующих лечения, перед процедурой косметически беспокоящих сосудистых звёздочек мы рекомендуем проведение ультразвукового исследования, так называемой доплерокодированной сонографии, которая также проводится в клинике им. Эриха Лексера. Если, например, диагностировано варикозное расширение вен (т.н. варикоз), кроме склерозирования или лазерной терапии в клинике им. Эриха Лексера могут быть предложены и оперативные методики, которые могут быть проведены дополнительно.

Как проводится склерозирование?

Этоксисклерол в различной концентрации вводится в сосуд через очень тонкие иглы. Вследствие этого внутренние поверхности сосуда склеиваются, он срастается, и образуется поверхностный, очень лёгкий тромбоз. Затем происходит компрессия зон, на которых проводилось склерозирование, что является важной предпосылкой для хорошего долговременного успеха.

Склерозирование сосудистых звёздочек - краткая информация

Продолжительность процедуры:

- приблизительно ½ часа

Последующий уход:

- Повязка может быть удалена самое позднее через 3 дня
- ношение компрессионных чулков на протяжении приблизительно 2-х недель
- защита от солнечных лучей, избегание жары
- непосредственно сразу после процедуры избегать стояния и сидения

Вид наркоза:

- нет

Пребывание в стационаре клиники:

- нет

Лечение сосудистых звёздочек микросклерозированием и лазером

После склерозирования

Сразу же после склерозирования Вам нельзя длительное время стоять или сидеть. Идеальной была бы часовая прогулка.

1. Просим Вас оставить компрессионные бинты на один день
2. Важно проведение контрольного обследования, где бинты будут сняты. В дальнейшем мы также рекомендуем проведение контрольных обследований.
3. В дневное время последующих двух дней рекомендуется ношение компрессионных чулков. Примерно через 2 недели может быть проведено склерозирование других областей.
4. Благодаря лёгкому тромбозу в сосудах, после проведения процедуры склерозирования, сосудистые звёздочки в первые 2 недели будет заметнее, чем ранее, иногда сосуд может стать осязаемым и выглядеть как веревка.
5. Избегайте в первые четыре недели принятия солнечных ванн, или используйте солнцезащитные средства с большим фактором защиты (минимум 25).
6. Как правило, для оптимального результата необходимо несколько циклов лечения.
7. Жара, прямые солнечные лучи и жаркая сауна расширяют сосуды и могут усилить сосудистые звёздочки.

Консультация

Во время консультации по поводу склерозирования сосудистых звёздочек в спокойной обстановке обсуждаются Ваши представления и пожелания, а также сомнения. В заключении проводится тщательное обследование венозной системы с помощью ультразвука. Также обсуждаются иные терапевтические возможности.

