

Ботулотоксин типа А

Устранение морщин инъекциями ботулотоксина типа А - это современная и очень эффективная методика борьбы с морщинами. Особенно хорошо ботулотоксин типа А подходит для устранения мимических морщин, прежде всего, вокруг глаз и на лбу. С помощью ботулотоксина типа А целенаправленно парализуются отдельные мышцы. Вследствие этого мышцы расслабляются и находящаяся над ними кожа и морщины расглаживаются. Кроме того, за счет паралича мускулатуры предотвращается дальнейшее углубление морщин. Действие начинается в течении первой недели после введения и заканчивается примерно через 3-6 месяцев. Длительный паралич мускулатуры не наступает.

Консультация

Во время консультации в спокойной обстановке подробно обсуждаются Ваши представления и пожелания, а также иные терапевтические возможности с использованием ботулотоксина типа А.



Кому показаны инъекции ботулотоксина типа А?

Процедура подходит мужчинам и женщинам без неврологических предшествующих заболеваний, таких как миастения гравис, синдром Ламберта-Итона-Рук.

Как проводятся инъекции ботулотоксина типа А?

Сначала проводится фотодокументирование исходного состояния с расслабленными и действующими мускулами лица. Пациенты лежат с приподнятой верхней частью тела. В заключении в предварительно отмеченные точки небольшим шприцем производятся инъекции ботулотоксина типа А. Процедура длится всего несколько минут. Наркоз для этого не нужен.

После лечения инъекциями ботулотоксина типа А

Сразу же после инъекции Вы получите охлаждающие компрессы для минимизации отеков и возможных кровоизлияний. После процедуры Вы должны примерно 4 часа не принимать горизонтального положения и не подвергаться тяжелым физическим нагрузкам. Этим Вы предотвратите нежелательное распространение впрыснутого вещества. В день процедуры Вы должны отказаться от занятий спортом и других действий, вызывающих усиленное кровоснабжение кожи. Также в этот день надо избегать массажа лица и на 3-4 часа занять прямое положение тела.

Устранение морщин инъекциями ботулотоксина типа А - краткая информация

Продолжительность процедуры:

- максимум полчаса

Последующий уход:

- действие препарата начинается уже на 2-3 день
- продолжительность действия - 3-4 месяца

Вид наркоза:

- местное обезболивание

Пребывание в стационаре клиники:

- амбулаторно